

説明文書

第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	パプトン鼻炎カプセル M
2	成分・分量	1日量3カプセル中 d-クロルフェニラミンマレイン酸塩6mg、フェニレフリン塩酸塩15mg、ベラドンナ総アルカロイド0.6mg、無水カフェイン150mg、カンゾウ抽出物50mg(カンゾウ715mgに相当) ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	次の1回量を1日3回服用してください。 ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。 15歳以上:1カプセル 15歳未満は服用しないでください
4	効能・効果	急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和:くしゃみ、鼻水(鼻汁過多)、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重(頭が重い)
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)、胃腸鎮痛鎮痙薬</p> <p>2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)</p> <p>3. 長期連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の症状のある人。 高熱、排尿困難 ・次の診断を受けた人。 緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧
6	薬剤師(又は登録販売者)が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。