

医薬品を正しく購入するための

# 説明文書

指定第2類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	恵快 ACE
2	成分・分量	1日量2包中 ボタンピ末200mg、シクヤク末200mg、ケイヒ末200mg、シヨウキョウ末100mg、甘草エキス35mg(カンゾウ500mgに相当)、地竜エキス散150mg(ジリュウ300mgに相当)、エテンザミド1000mg、アセトアミノフェン600mg、無水カフェイン240mg、合成ヒドロタルサイト540mg ※添加物は外箱、添付文書を参照
3	用法・用量	次の1回量を、なるべく空腹時をさけて服用してください 1日2回を限度とし、服用間隔は6時間以上おいてください 15歳以上:1包 11歳以上15歳未満:2/3包 7歳以上11歳未満:1/2包 3歳以上7歳未満:1/3包
4	効能・効果	・頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛(のどの痛み)・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざにともなう痛み(ねんざ痛)・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛 ・悪寒(発熱によるさむけ)・発熱時の解熱
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	1. 次の人は服用しないでください 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬 3. 服用前後は飲酒しないでください 4. 長期連用しないでください  次に該当する人はお申し出ください ・医師又は歯科医師の治療を受けている人。 ・妊婦又は妊娠していると思われる人。 ・授乳中の人。 ・水痘(水ぼうそう)若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児(15歳未満)。 ・高齢者。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・次の診断を受けた人。 心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍  【小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。】
6	薬剤師(又は登録販売者)が必要と判断する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。

2022. 8. 24 作成