

4 904751 403041

## 解熱鎮痛薬

# ノックペインA

## 発熱・頭痛に

- ・眠くなる成分は含まれていません
- ・7才から服用できます
- ・胃にやさしい

### 【効能・効果】

- 1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛(どの痛み)・耳鳴・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざにともなう痛み(ねんざ痛)・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
- 2) 悪寒(発熱によるさむけ)・発熱時の解熱



製造販売元  
田村薬品工業株式会社  
奈良県御所市西寺田50

セルフメディケーション  
税控除対象

内容量 20錠

第2類医薬品

服用の都度チャックをしっかり閉めること。

服用前にこの袋の説明文を必ず読むこと。また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

### △ 使用上の注意

- ☒ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる) 1. 次の人は服用しないこと (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと: 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬 3. 服用前後は飲酒しないこと 4. 長期連用しないこと ■ **相談すること** 1. 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師又は歯科医師の治療を受けていた人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 草薙などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5) 次の診断を受けた人: 心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐・食欲不振
精神神経系	めまい
その他	過度の体温低下

まれに右記の重篤な症状が起こることがある。

**用法・用量** 1日3回を限度としなるべく空腹時をさせて服用する。服用間隔は4時間以上おくこと。●成人(15歳以上): 1回2錠 ●7歳以上15歳未満: 1回1錠 ●7歳未満: 服用しないこと。(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。(2) 用法・用量を厳守すること。(3) 錠剤の取り出し方: パウチからPTPシートを取り出し、団の上に凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用すること(誤っておしゃべりシート・PTPシート・PTPシート取り出し団のまま飲み込んだりすると食道粘膜に突刺する等思わぬ事故につながる)。

お問い合わせ先

お客様相談室 06-6203-5151

受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

使用期限

その場合は直ちに医師の診察を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれにくしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混迷等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群(ステイブンソン症候群)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなったり皮膚上に小さなアブツ(小豆腫)が出る、全身がだい、食欲がない等で持続したり、急激な振戻がある。
----------------------	--

薬剤性過敏症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだい、リバーゲン、むの下、股の付け根等のいずれかがあらわれる。
----------	--

肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
-------	---

腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(筋々が痛む)、下痢等があらわれる。
-----	---

間質性肺炎	階段を上りたり、少し無理をしたりすると思われるがする、息をつくする、空せき、発熱等があらわれる、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
-------	---

ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒュヒュと鳴る、息苦しい音があらわれる。
------	---------------------------------

3.5~6 回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**成分・分量** 1日量(6錠) 中 アセトアミノフェン 900mg [添付] 結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースNa、スクロース、ステアリン酸Mg、香料  
保有及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない温涼の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

ごみを出すときは各市町村の区分にしたがってください。

副作用被害救済制度

電話: 0120-149-931  
(フリーダイヤル)



RP01